

LITHIUM

Dès 1^{er} épisode maniaque, 2^{ème}/3^{ème} épisode dépressif (+AD à vie)

<p>Bilan préthérapeutique</p> <p>NFS Iono sang et urine, Ca, P, urée, créat (clairance) BU voire HLM, protéinurie des 24H Glycémie à jeun Bilan hépatique ECG TSHus Béta-hCG Parfois EEG</p> <p>Associations du lithium à éviter avec Diurétiques, IEC, AINS</p>	<p>Mise en route du traitement</p> <p>THERALITHE 250 1cp matin et soir pendant 4 jours Dosage de la lithiémie à J4-J5 avant la prise matinale Augmentation progressive jusqu'à lithiémie efficace (0,6-1) avec contrôle selon le même schéma tous les 4j vérification de la stabilisation sur trois semaines consécutives puis cf surveillance Passage à une forme LP possible (0,8-1,2) Education patient et proches signes de surdosage, carte</p> <p>Surveillance Li mensuelle/3mois puis tous les 2-6 mois Créat/6 mois TSHus/an</p>
--	--

Effets indésirables ; attention à la **tératogénicité**

Digestifs	Neurologiques	Endocrinologique	Cardiaques	Hématologiques	Néphrologiques	Cutanés
Prise de poids Nausées Vomissements Diarrhées Troubles digestifs	Tremblements (extrémités) Sédation , léthargie Obnubilation Crise convulsive Ataxie Vertiges Syndrome sérotoninergique Hypotonie musculaire	Goître Hyperparathyroïdie Hypercalcémie	Myocardiopathie Bradycardie Bloc sinoauriculaire BAV Troubles de la repolarisation	Polynucléose neutrophile Leucocytose Lymphopénie	Soif Polyurie Diabète insipide néphrogénique Syndrome néphrotique	Alopécie Acné Psoriasis

Signes de surdosages : somnolence, asthénie, digestifs, anurie, tremblement, équilibre (ataxie), céphalées, rigidité (syndrome extra-pyramidal), incoordination (ataxie), élargissement des QRS : « SADATE CRIE »