

Ordonnance pour diarrhée aigue et réhydratation orale

Ordonnance 1 : traitement médicamenteux

Docteur X
ADELI
Coordonnées, etc.

Lieu, Date

Enfant Y, sexe, poids

- ADIARIL

Remplir un biberon de 200 ml d'eau peu minéralisée, ajouter deux cuillère-mesures d'ADIARIL, bien mélanger, conserver au frais pendant max 24 H.

Proposer à volonté, en petites quantités au début

- TIORFAN

1 sachet x 3 à 10 mg/jour si poids < 9kg pendant 5 jours
2 sachets x 3 9- 13 kg

- SMECTA

1 sachet par jour pendant 5 jours

- EFFERALGAN PEDIATRIQUE

1 dose-poids toutes les 8 heures si fièvre

Signature

Ordonnance 2 : conseils et surveillance

Mesures associées :

Reprendre alimentation normale après 4 heures de réhydratation exclusive.

Poursuite de l'alimentation au sein alternée avec réhydratation si alimentation maternelle exclusive

Lait sans lactose si persistance de la diarrhée

Lait aux hydrolysats de protéines de lait de vache si < 3 mois

Lavage des mains après contact avec l'enfant

Isoler l'enfant de sa fratrie, éviction scolaire

Surveillance :

Nombre de selles liquides, épisodes de vomissements, température, poids

Quantités bues, prise alimentaire

Contacteur médecin si prise de poids incorrecte, vomissements incoercibles, altération de l'état général persistante

Ordonnance 3 :

Location d'une balance pour surveillance du poids pendant 5 jours